

Stand: 02.07.2020

ALPACA	Phase II Studie zur Induktionstherapie mit NAB-Paclitaxel/Gemcitabine als Erstlinienbehandlung von metastasiertem Pankreaskarzinom
	Induction Treatment With Nab-paclitaxel/Gemcitabine for First-line Treatment of Metastatic Pancreatic Cancer Followed by Either Alternating Application of Gemcitabine Monotherapy and Nab-paclitaxel/Gemcitabine or Continuing Application of Nab-paclitaxel/Gemcitabine: A Randomized Phase II Study
NCT-Nummer	NCT02564146
EudraCT-Nummer	2014-004086-24; EudraCT: 2014-004086-24
Studienstatus	Rekrutierung offen
Studiendesign	multizentrisch, prospektiv, Therapiestudie, randomisiert, offen/unverblindet, zweiarmig, Investigator Initiated Trial (IIT)
Ziel	Gesamtüberleben ab Randomisierung, Assessment der Lebensqualität.
Behandlung	Gemcitabin plus Nab-Paclitaxel
Erkrankung	GASTRO – Pankreaskarzinom – palliativ
Sponsor	AIO-Studien-gGmbH
LKP	Frank Kullmann Kliniken Nordoberpfalz AG Klinikum Weiden